Una nueva especie del género *Lethocerus* y el alotipo de Lethocerus Del Pontei

(Hem. Belostomidae)

por

José A. De Carlo

Ayudante de la Sección Entomología del Mus. de Hist. Nat. de Buenos Aires.

Alotipo de **Lethocerus Del Pontei** De Carlo.

En el N.º 13 de esta revista, página 108, lám. VII, fot. 24, describí como holotipo de la especie, un ejemplar macho procedente de Iguazú (Gob. de Misiones), e indiqué como para-tipo, otro macho de Puerto Guarani (Paraguay).

Tengo ahora el placer de dar a conocer el alotipo de esta especie, como también ampliar sus características y distribución geográfica.

Alotipo: long., 65 mm.; lat. máx., 25 mm.

Los caracteres, en general, son los mismos que los indicados para el holotipo.

Como diferencias señalo, que el espacio interocular comprendido entre la base del clipeo y el vertex no es completamente oscuro, sino que deja un débil filete claro a lo largo del borde de los ojos; el abdomen, además del color rojizo, se halla salpicado de manchitas oscuras.

Este ejemplar ha sido capturado por el Dr. Arístides Fiora en la Capital de la Provincia de Jujuy.

Un segundo individuo del mismo sexo, procedente del Estado de Paraná (Brasil), es muy poco menor que el anterior, pero con iguales caracteres.

Alotipo en el Museo de Buenos Aires, N.º de cat. 26720; para-tipo en la misma institución, N.º de cat. 26721.

Aprovechando estos nuevos ejemplares, doy el color de la especie y agrego dos nuevos datos para su mejor determniación.

Color, pardo oscuro bastante uniforme; clavus con nervios visibles en la parte inferior; disco del corium con nervios longitudinales anastomosados, muy bien marcados.

El ejemplar holotipo presenta una débil carena en el espacio inter ocular, carácter éste que no considero como específico, dado que los restantes individuos que he examinado no lo poseen.

Lethocerus Bruchi n. sp.

Long., 67 mm.; lat. máx., 26 mm.

Sexo: macho.

Color, pardo bastante uniforme.

Espacio interocular, ancho, siendo su latitud máxima apenas menor que el ancho mayor de un ojo, sus costados laterales casi paralelos; parte del espacio interocular comprendido entre el vertex y la base del clipeo, ligeramente carenado y algo oscurecido debido a zonas negruzcas que alternan con otras de color pardo claro; ojos angostos, más largos que anchos, muy poco salientes.

Pronoto muy transversal; disco bastante convexo, con dos listones amarillo claro, de poca extensión, en la parte anterior media, y dos depresiones convergentes a cada lado del surco longitudinal, siendo las inferiores más largas y poco marcadas; largo de la porción del pronoto comprendida entre el surco transversal y el borde posterior, menor que la mitad del largo total del disco en su línea media

Clavus con nervios visibles en la parte inferior; disco del corium con nervios anastomosados, bien marcados.

Fémures del primer par de patas, el doble más dilatados que los intermediarios; uña de los tarsos anteriores visiblemente más larga que los dos artículos juntos; tibias de las patas posteriores medianamente dilatadas, muy poco más que el mayor ancho del espacio interocular.

Tibias y fémures de las patas intermediarias y posteriores, con tres bandas oscuras no bien diseñadas; tibias anteriores sin bandas visibles.

Abdomen de color pardo, con ligero viso rojizo visto con poca luz.

Patria: Brasil (Estado de Paraná).

Holotipo en el Museo de Buenos Aires, N.° de cat. 26722.

Esta especie que tengo el honor de dedicar al distinguido entomólogo Dr. Carlos Bruch, mundialmente conocido por sus importantes trabajos en hormigas, mirmecófilos y coleópteros, se diferencia esencialmente de la *annulipes* H. S., por carecer de la banda longitudinal oscura que bordea los costados del disco abdominal; de la *Del Pontei* De Carlo, porque esta especie tiene las tibias posteriores más dilatadas, el espacio interocular angosto, casi la mitad del mayor ancho de las tibias posteriores, los ojos más anchos y el color pardo oscuro.